

**ARNICA WELEDA**

**(Arnica montana D3)**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda**

**Solução Gotas**

**1000,0 mg/mL**

**Arnica Weleda**

Arnica montana D3

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO****Arnica Weleda** - Arnica montana D3**MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO****APRESENTAÇÃO**

Solução gotas de Arnica montana D3.

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 50 mL.

**USO ORAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO**

Cada 1 mL de solução gotas contém:

Arnica montana D3 ..... 1000,0 mg

Graduação alcoólica 15%.

Cada 1 mL de **Arnica Weleda** equivale a 28 gotas.**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Arnica Weleda** é um medicamento antroposófico indicado para auxiliar no tratamento de contusões, hematomas, fraturas, ferimentos, machucados, quedas, pancadas e excessos musculares. Atua sobre traumas musculares e físicos (em suas consequências imediatas e tardias, locais ou gerais) e também é indicado no pós-operatório para melhor recuperação. **Arnica Weleda** auxilia ainda nas dores, sejam elas generalizadas, musculares ou articulares e atua nas contraturas musculares, distensões e lesões.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

**Arnica Weleda**, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha por meio do estímulo das forças autocurativas do organismo, e tem como mecanismo de ação estimular no ser humano uma reação que levará à cura ou ao alívio da enfermidade, servindo para a harmonização dos distúrbios de saúde acima relacionados.

Um medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença – esta é a maneira alopática de ação, por exemplo, para uma inflamação, quando pode-se usar uma planta que estimule no organismo suas atividades anti-inflamatórias; (2) agindo de modo igual à doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura – este é um princípio homeopático de ação: aquilo que provoca também pode curar; e (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente, levando à sua atividade sadia – este princípio é exclusivo dos medicamentos antroposóficos.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Arnica Weleda** é contraindicada para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento contém 15% de álcool (etanol) e pode causar intoxicação, especialmente em crianças.**

**Interações medicamentosas: até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.**

**Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15-30°C), em local seco, protegido da luz solar, e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, computador, raios-X, caixa acústica, etc.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Arnica Weleda solução gotas é uma solução hidroalcoólica límpida, transparente e levemente amarelada.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Crianças de 0 a 5 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 5 gotas diluídas em água a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 5 gotas diluídas em água 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

**Crianças de 5 a 12 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 10 gotas diluídas em água a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 10 gotas diluídas em água 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

**Adolescentes de 12 a 18 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 15 gotas diluídas em água a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 15 gotas diluídas em água 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

**Adultos acima de 18 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 15 a 20 gotas diluídas em água a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 15 a 20 gotas diluídas em água 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

A posologia poderá ser alterada a critério médico.

É indicada a diluição da dose, conforme posologia, em aproximadamente 50 mL de água. Quando a dose é administrada em água, o álcool se dilui, sendo mais bem tolerado. Evite gotejar o medicamento diretamente na boca sob a língua, pois a presença de álcool pode produzir ardência em indivíduos sensíveis.

Para obtenção de resposta terapêutica satisfatória, recomenda-se o uso deste medicamento por pelo menos 7 dias.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

**Registro n.º: 1.0061.0004.**

**Registrado e produzido por:**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.**

**Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33**

**CEP 05125-000 - São Paulo - SP**  
**CNPJ 56.992.217/0001-80**  
**Indústria Brasileira**  
**S.A.C. 0800 055 32 66**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**



ME4791-04

**ARNICA WELEDA**

**(Arnica montana D3)**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda**

**Glóbulos**

**80,0 mg**

**Arnica Weleda**

Arnica montana D3

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

Arnica Weleda - Arnica montana D3

**MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO****APRESENTAÇÃO**

Glóbulos de Arnica montana D3.

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 20 g.

**USO ORAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO**

Cada 1 g de glóbulos contém:

Arnica montana D3 .....	80,0 mg
Glóbulos inertes nº 5 q.s.p.....	1000,0 mg

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Arnica Weleda** é um medicamento antroposófico indicado para auxiliar no tratamento de contusões, hematomas, fraturas, ferimentos, machucados, quedas, pancadas e excessos musculares. Atua sobre traumas musculares e físicos (em suas consequências imediatas e tardias, locais ou gerais) e também é indicado no pós-operatório para melhor recuperação. **Arnica Weleda** auxilia ainda nas dores, sejam elas generalizadas, musculares ou articulares e atua nas contraturas musculares, distensões e lesões.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

**Arnica Weleda**, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha por meio do estímulo das forças autocurativas do organismo, e tem como mecanismo de ação estimular no ser humano uma reação que levará à cura ou ao alívio da enfermidade, servindo para a harmonização dos distúrbios de saúde acima relacionados.

Um medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença – esta é a maneira alopática de ação, por exemplo, para uma inflamação, quando pode-se usar uma planta que estimule no organismo suas atividades anti-inflamatórias; (2) agindo de modo igual à doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura – este é um princípio homeopático de ação: aquilo que provoca também pode curar; e (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente, levando à sua atividade sadia – este princípio é exclusivo dos medicamentos antroposóficos.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Arnica Weleda** é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Atenção: Contém sacarose (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g/glóbulo. Deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má absorção de glicose-galactose e por pessoas com insuficiência de sacarose-isomaltase.**

**Interações medicamentosas: até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.**

**Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15-30°C), em local seco, protegido da luz solar, e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, computador, raios-X, caixa acústica, etc.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Arnica Weleda glóbulos são grãos esféricos, homogêneos, regulares, consistentes e de cor branca.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Crianças de 0 a 5 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 3 glóbulos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 3 glóbulos 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser dissolvidos em uma colher (chá) de água ou leite materno antes de serem administrados.

**Crianças de 5 a 12 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 7 glóbulos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 7 glóbulos 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser dissolvidos em uma colher (chá) de água ou leite materno antes de serem administrados.

**Adolescentes de 12 a 18 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 10 glóbulos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 10 glóbulos 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser engolidos com água ou dissolvidos na boca.

**Adultos acima de 18 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 10 a 14 glóbulos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 10 a 14 glóbulos 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

Os glóbulos podem ser engolidos com água ou dissolvidos na boca.

A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Para obtenção de resposta terapêutica satisfatória, recomenda-se o uso deste medicamento por pelo menos 7 dias.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

**Registro n.º: 1.0061.0004.**

**Registrado e produzido por:**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.**

**Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33  
CEP 05125-000 - São Paulo - SP  
CNPJ 56.992.217/0001-80  
Indústria Brasileira  
S.A.C. 0800 055 32 66**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**



**ME4793-03**

**ARNICA WELEDA**

**(Arnica montana D3)**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda**

**Comprimidos**

**185,0 mg**

**Arnica Weleda**

Arnica montana D3

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

Arnica Weleda - Arnica montana D3

**MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO****APRESENTAÇÃO**

Comprimidos de Arnica montana D3.

Embalagem: frasco de vidro âmbar com 80 comprimidos.

**USO ORAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido contém:

Arnica montana D3 .....185,0 mg

Excipientes\* q.s.p. .... 1 comprimido

\*amido (milho), estearato de magnésio (vegetal) e lactose monoidratada.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Arnica Weleda** é um medicamento antroposófico indicado para auxiliar no tratamento de contusões, hematomas, fraturas, ferimentos, machucados, quedas, pancadas e excessos musculares. Atua sobre traumas musculares e físicos (em suas consequências imediatas e tardias, locais ou gerais) e também é indicado no pós-operatório para melhor recuperação. **Arnica Weleda** auxilia ainda nas dores, sejam elas generalizadas, musculares ou articulares e atua nas contraturas musculares, distensões e lesões.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

**Arnica Weleda**, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha por meio do estímulo das forças autocurativas do organismo, e tem como mecanismo de ação estimular no ser humano uma reação que levará à cura ou ao alívio da enfermidade, servindo para a harmonização dos distúrbios de saúde acima relacionados.

Um medicamento antroposófico pode agir, de acordo com sua composição, de três modos: (1) estimulando um processo contrário à doença – esta é a maneira alopática de ação, por exemplo, para uma inflamação, quando pode-se usar uma planta que estimule no organismo suas atividades anti-inflamatórias; (2) agindo de modo igual à doença e provocando uma reação contrária maior do organismo no sentido da cura – este é um princípio homeopático de ação: aquilo que provoca também pode curar; e (3) proporcionando um modelo orientador para o órgão ou sistema doente, levando à sua atividade sadia – este princípio é exclusivo dos medicamentos antroposóficos.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Arnica Weleda** é contraindicada para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Pessoas com intolerância à lactose podem apresentar desarranjo intestinal e gases.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Atenção: Contém lactose (tipo de açúcar) abaixo de 0,25g/comprimido. Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

**Interações medicamentosas: até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.**

**Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15-30°C), em local seco, protegido da luz solar, e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, computador, raios-X, caixa acústica, etc.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Arnica Weleda apresenta-se na forma de comprimidos cilíndricos biconvexos, de consistência sólida, textura granular e cor branca.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Crianças de 0 a 5 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 1 comprimido diluído em água a cada 4h por 2 dias, depois a cada 6h por 3 dias, e posteriormente a cada 8h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 1 comprimido 1 a 2 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

Os comprimidos podem ser triturados e dissolvidos em uma colher (sobremesa) de água antes de serem administrados.

##### **Crianças de 5 a 12 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 1 comprimido diluído em água a cada 4h por 2 dias, depois a cada 6h por 3 dias, e posteriormente a cada 8h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 1 comprimido 2 a 3 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

Os comprimidos podem ser triturados e dissolvidos em uma colher (sobremesa) de água antes de serem administrados.

##### **Adolescentes de 12 a 18 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 1 comprimido a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 1 comprimido 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

Tomar os comprimidos com um copo de água. Para facilitar a administração, os comprimidos podem ser mastigados ou dissolvidos na boca.

**Adultos acima de 18 anos:**

**Para casos agudos:** tomar 1 a 2 comprimidos a cada 2h por 2 dias, depois a cada 3h por 3 dias, e posteriormente a cada 4h até o desaparecimento dos sintomas.

**Para manutenção e nos casos crônicos:** tomar 1 a 2 comprimidos 3 a 4 vezes ao dia, preferencialmente em intervalos regulares; ou conforme orientação médica.

Tomar os comprimidos com um copo de água. Para facilitar a administração, os comprimidos podem ser mastigados ou dissolvidos na boca.

A posologia poderá ser alterada a critério médico.

Para obtenção de resposta terapêutica satisfatória, recomenda-se o uso deste medicamento por pelo menos 7 dias.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Pessoas com intolerância à lactose podem apresentar desarranjo intestinal e gases. Além disso, ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

**Registro n.º: 1.0061.0004.**

**Registrado e produzido por:**  
**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.**  
**Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33**  
**CEP 05125-000 - São Paulo - SP**  
**CNPJ 56.992.217/0001-80**  
**Indústria Brasileira**  
**S.A.C. 0800 055 32 66**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação de um profissional de saúde.**



**ME4792-03**

**Histórico de Alteração da Bula**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
10/09/2025	N.A.	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	O que devo saber antes de utilizar este medicamento? (glob.) Logomarca da empresa	VP	D3 SOL GOT OR CT FR GOT VD AMB X 50 ML  D3 GLOB CT FR VD AMB X 20 G  D3 COM CT FR VD AMB X 80
09/06/2025	0774313/25-1	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	16/07/2024	0967366/24-1	10275 - DINAMIZADO –Alteração de texto de bula (ou folheto) / 11384 –	26/05/2025	Para que este medicamento é indicado? Como este medicamento funciona? Quando não devo usar este medicamento? (comp)	VP	D3 SOL GOT OR CT FR GOT VD AMB X 50 ML  D3 GLOB CT FR VD AMB X 20 G  D3 COM CT FR VD AMB X 80
			08/07/2024	0927669/24-6	DINAMIZADO – Alteração de posologia / 11387 –		Como devo usar este medicamento? Quais os males que este medicamento pode me causar? (comp)		
			08/07/2024	0927677/24-7	DINAMIZADO – Inclusão de Indicação Terapêutica prevista em literatura				
03/07/2024	0908635/24-9	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Composição (gradação alcoólica)	VP	D3 SOL GOT OR CT FR GOT VD AMB X 50 ML

## WELEDA

		Bulário RDC 60/2012							
20/04/2023	0400111/23-3	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VP	D3 SOL GOT OR CT FR GOT VD AMB X 50 ML  D3 GLOB CT FR VD AMB X 20 G  D3 COM CT FR VD AMB X 80
17/01/2022	0213960/22-2	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Dizeres Legais	VP	D3 SOL GOT OR CT FR GOT VD AMB X 50 ML  D3 GLOB CT FR VD AMB X 20 G  D3 COM CT FR VD AMB X 80
17/06/2021	2348969/21-1	10455 DINAMIZADO – Notificação de alteração de texto de bula – Publicação no Bulário RDC 60/2012	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Inclusão inicial de texto de bula	VP	D3 SOL GOT OR CT FR GOT VD AMB X 50 ML  D3 GLOB CT FR VD AMB X 20 G  D3 COM CT FR VD AMB X 80