

GINSENG® 380 mg

Panax ginseng **EXTRATO SECO**

CÁPSULA · USO ORAL · USO ADULTO

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

Nomenclatura botânica oficial: *Panax Ginseng*

Nomenclatura popular: Ginseng

Família: Araliaceae

Parte da planta utilizada: Raízes

APRESENTAÇÕES:

Cápsulas gelatinosas duras com 500mg de extrato seco de *Panax ginseng*.

Cartucho com 30 ou 45 cápsulas

COMPOSIÇÃO:

Cada cápsula contém:

Extrato seco de *Panax ginseng* 500mg

Padronizado em 15mg (3,0%) de ginsenosídeos.

UTILIZADO COMO: Em caso de fadiga física e mental

CONTRAINDICAÇÕES: Nos casos de enfermidades agudas, trombose coronariana, enfermidades cardíacas severas e hemorragias, esquizofrenia, hipersensibilidade nervosa, histeria, hipertensão, taquicardia e síndromes febris. Não deve ser usado em crianças menores de 12 anos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:


INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado em fadiga física e mental.

RESULTADOS DE EFICÁCIA

As características que deve reunir uma planta adaptógena são quatro: possuir ação antifadiga frente a esforços físicos e mentais, aumentar a resistência ao estresse, tender a normalizar os estados patológicos do organismo e ser inócuo do ponto de vista toxicológico.

código interno



PHARMACODE

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O *Panax ginseng* é considerado uma planta de efeitos adaptógenos, por isso chamada de adaptógena, pois não atua especificamente em uma debilidade física ou psicológica, mas revitaliza o organismo de uma maneira geral a fim de estimular suas próprias defesas imunológicas contra agentes externos agressores e promove estímulo físico e mental.

CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado em casos de enfermidades agudas, trombose coronariana, enfermidades cardíacas severas, hemorragias, esquizofrenia, hipersensibilidade nervosa, histeria, hipertensão, taquicardia e síndromes febris.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos de idade.

Este medicamento é contra-indicado durante a gravidez e lactação.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco C.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

O Ginseng não deve ser utilizado continuamente por períodos superiores a 3 meses, devendo-se realizar intervalos de 2 a 3 meses entre os tratamentos.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco C.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

Não existem recomendações específicas para o uso deste medicamento em pacientes idosos e outros grupos de risco.

Não deve ser utilizado em crianças menores 12 anos de idade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Recomenda-se não associar com medicamentos tais como, inibidores da monoaminoxidase, fenelzina, drogas antipsicóticas e hormonais, diltiazem, nifedipina, verapamil, heterosídeos digitálicos, etionamida, griseofulvina, metildopa, fenotiazinas e espironolactonas.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar o medicamento em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) protegendo da umidade.

Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o

consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

GINSENG é constituído de cápsulas gelatinosas duras contendo pó de coloração bege claro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

USO ORAL / USO INTERNO

Ingerir 1 cápsula ao dia, de preferência pela manhã.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

REAÇÕES ADVERSAS

"Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa, disponível em <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/vigimed> ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal".

SUPERDOSE

A superdosagem pode levar ao surgimento da Síndrome de Abuso do Ginseng, a qual apresenta hipertensão arterial, estado de agitação com insônia, erupções cutâneas e diarreia matinal. Essa síndrome se agrava com o uso de cafeína. Alguns pacientes manifestaram sintomas digestivos tais como gastrites, náuseas, diarreias e vômitos, portanto desaconselha-se o uso em antecedentes de úlceras gastroduodenais. O ginseng quando usado por períodos longos pode causar mastalgias, embora não se tenha observado aumento de estrógenos circulantes no sangue. Para evitar esses transtornos, aconselha-se o uso do ginseng por um período de 30 a 45 dias, fazendo uma pausa de 20 dias antes de iniciar novamente o tratamento.

Caso ocorra a ingestão de doses muito acima das preconizadas recomenda-se monitorar as funções vitais.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação da saúde.

Esta bula foi atualizada conforme a Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 24/09/2014

DIZERES LEGAIS:

M.S.: 1.2009.0025

Responsável Técnica: Dra. Juliana O. Borges

CRF SP: 25.266

BIONATUS LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.

Av. Domingos Falavina, 1041 – Jardim Mugnaini,

São José do Rio Preto-S.P.

CEP: 15.045-395 - CNPJ: 68.032.192/0001-51



Indústria Brasileira



MATERIAL
RECICLÁVEL