

**Fycompa®**  
perampanel

**United Medical Ltda.**

Comprimido revestido  
2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg

**Fycompa®**  
perampanel

## APRESENTAÇÕES

### Comprimidos Revestidos

Fycompa® é apresentado como comprimidos revestidos contendo 2, 4, 6, 8 mg de perampanel em embalagens de 28 comprimidos.

## USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém: 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg de perampanel.

Excipientes:

Núcleo do comprimido de 2mg e 4mg: lactose monoidratada, hidroxipropilcelulose de baixa substituição, povidona, estearato de magnésio.

Núcleo do comprimido de 6mg e 8mg: lactose monoidratada, hidroxipropilcelulose de baixa substituição, povidona, celulose microcristalina, estearato de magnésio.

Filme de revestimento (comprimidos de 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg): hipromelose 2910, talco, macrogol 8000, dióxido de titânio (E171), corantes\*.

\*Os corantes são:

- Comprimido de 2 mg: óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho.
- Comprimido de 4 mg e 6 mg: óxido de ferro vermelho.
- Comprimido de 8 mg: óxido de ferro vermelho, óxido de ferro preto.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Fycompa® é um medicamento indicado para o tratamento de convulsões (ataques repetidos) de início parcial (ataques que afetam uma parte do seu cérebro) com ou sem convulsões secundariamente generalizadas (ataque que afeta todo o seu cérebro) em pacientes com epilepsia de 12 anos de idade ou mais.

Fycompa® é um medicamento indicado para o tratamento adjuvante de convulsões (ataques repetidos) de início parcial (ataques que afetam uma parte do seu cérebro), com ou sem convulsões secundariamente generalizadas (ataque que afeta todo o seu cérebro), em pacientes com epilepsia de 12 anos de idade ou mais.

Fycompa® é um medicamento indicado para o tratamento adjuvante de convulsões tônico-clônicas generalizadas primárias (perda da consciência seguida de contrações sustentadas (tônica) dos músculos seguida de períodos de contrações musculares alternadas com relaxamento (clônica), em pacientes com epilepsia de 12 anos de idade ou mais.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O perampanel é uma droga antiepilética que age nas transmissões nervosas no cérebro, reduzindo as atividades excitatórias de alguns receptores. O mecanismo preciso pelo qual perampanel exerce seus efeitos antiepiléticos em humanos não foi completamente elucidado.

Com base em dados obtidos de indivíduos saudáveis, cerca de 85% da concentração média de perampanel em estado estável são alcançados no início da segunda semana de tratamento com 4

mg/dia, e 97% da concentração média de perampanel são atingidos no início da terceira semana de tratamento com 4 mg/dia.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não tome Fycompa<sup>®</sup> se:

- Você for alérgico ao perampanel ou qualquer outro ingrediente deste medicamento.
- Você tiver problemas graves no fígado ou problemas moderados ou graves nos rins.
- Você tiver desenvolvido erupção grave na pele ou exfoliação da pele, formação de bolhas e/ou feridas da boca depois de tomar perampanel.

**Este medicamento não deve ser usado por crianças menores de 12 anos de idade.**

**Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Converse com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Fycompa<sup>®</sup>.

Você não deve tomar Fycompa<sup>®</sup> se tiver problemas graves no fígado ou problemas moderados ou graves nos rins.

Antes de tomar Fycompa<sup>®</sup>, informe o seu médico sobre todas as suas condições médicas, incluindo se você:

- tem ou tiver tido depressão, problemas de humor, comportamento agressivo ou hostil (por exemplo, comportamento homicida), pensamentos ou comportamento suicida ou outros problemas psiquiátricos;
- tem problemas no fígado ou nos rins;
- beber álcool;
- abusou de medicamentos prescritos, drogas de rua ou álcool no passado;
- estiver grávida ou planeja engravidar. Não se sabe se a Fycompa<sup>®</sup> irá prejudicar o seu feto;
- amamenta ou planejar amamentar. Não se sabe se Fycompa<sup>®</sup> passa para o leite materno. Converse com seu médico sobre a melhor maneira de alimentar seu bebê se você tomar o Fycompa<sup>®</sup>. Você e seu médico devem decidir se você vai tomar Fycompa<sup>®</sup> ou amamentar. Você não deve fazer ambos.

**O abuso deste medicamento pode causar dependência.**

**Este medicamento pode causar danos ao fígado. Por isso, seu uso requer acompanhamento médico estrito e exames laboratoriais periódicos para controle.**

**Informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma**, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e suplementos de ervas.

Tomar Fycompa<sup>®</sup> com alguns outros medicamentos pode causar efeitos colaterais ou reduzir o benefício de qualquer dos medicamentos.

**Especialmente informe seu médico se você tomar:**

- contraceptivos hormonais (controle de natalidade). Fycompa<sup>®</sup> pode reduzir a capacidade do seu contraceptivo em prevenir a gravidez. Use uma forma adicional de contracepção não hormonal (como preservativos ou um diafragma e espermicida) enquanto estiver usando Fycompa<sup>®</sup> e por 1 mês depois de parar de tomar Fycompa<sup>®</sup>.
- carbamazepina;

- fenitoína;
- oxcarbazepina;
- rifampicina;
- Erva de São João.

### **Qual é a informação mais importante que eu deveria saber sobre a Fycompa®?**

Fycompa® pode causar problemas mentais (psiquiátricos), incluindo:

- comportamento agressivo novo ou pior (incluindo comportamento homicida), hostilidade, raiva, ansiedade ou irritabilidade sendo suspeito ou desconfiado (acreditar em coisas que não são verdadeiras), ver objetos ou ouvir coisas que não existem, confusão, dificuldade com a memória, dentre outras alterações incomuns ou extremas no comportamento ou humor.

Informe imediatamente o seu médico se você tiver problemas mentais novos ou agravados durante o tratamento com Fycompa®.

Como outros medicamentos antiepiléticos, Fycompa® pode causar pensamentos ou ações suicidas em um número muito pequeno de pessoas, cerca de 1 em 500.

### **Chame um médico imediatamente se tiver algum destes sintomas, especialmente se forem novos, piores ou preocupantes:**

- pensamentos sobre suicídio ou morte;
- nova ou pior depressão;
- sentindo-se agitado ou cansado;
- sono agitado (insônia);
- agindo de forma agressiva, irritada ou violenta;
- um aumento extremo na atividade e falando (mania);
- tentativa de cometer suicídio;
- novos ou piores ansiedade;
- ataques de pânico;
- irritabilidade nova ou pior;
- agindo em impulsos perigosos;
- outras mudanças incomuns no comportamento ou humor.

Pensamentos ou ações suicidas podem ser causados por outras coisas que não medicamentos. Se você tiver pensamentos ou ações suicidas, seu médico poderá verificar outras causas.

### **Como posso observar os primeiros sintomas de pensamentos e ações suicidas?**

Preste atenção a quaisquer mudanças, especialmente mudanças súbitas em humor, comportamentos, pensamentos ou sentimentos. Mantenha todas as visitas de acompanhamento com seu médico, conforme programado.

Ligue para o seu médico entre as visitas, conforme necessário, especialmente se você estiver preocupado com os sintomas. **Não pare Fycompa® sem falar com um profissional de saúde.** Parar Fycompa® de repente pode causar sérios problemas. Parar Fycompa® repentinamente pode fazer com que você tenha convulsões com mais frequência.

Foram notificadas reações graves na pele, incluindo reação a fármaco com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS) e Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), associadas à utilização de perampanel.

- Entre outros possíveis sintomas, a DRESS tipicamente manifesta-se como sintomas gripais e erupção na pele com temperatura corporal elevada, apresentação de níveis aumentados de enzimas do fígado nas análises ao sangue, um aumento num tipo de glóbulos brancos (eosinofilia) e gânglios linfáticos aumentados.
- A Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) pode surgir inicialmente sob a forma de manchas em alvo avermelhadas ou exantemas circulares, frequentemente com bolhas centrais no tronco. Também podem ocorrer úlceras na boca, garganta, nariz, genitais e olhos (olhos inchados e vermelhos). Estas erupções cutâneas graves são muitas vezes precedidas por febre e/ou sintomas gripais. As erupções podem progredir para descamação cutânea generalizada e complicações potencialmente fatais ou morte.

### Crianças

Fycompa® não é recomendado para crianças com menos de 12 anos de idade. A segurança e a eficácia ainda não são conhecidas nessa faixa etária.

### Outros medicamentos e Fycompa®

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver tomando ou tiver tomado recentemente qualquer outro medicamento. Isto inclui medicamentos obtidos sem prescrição médica e fitoterápicos. O uso de Fycompa® com alguns tipos de medicamentos pode causar efeitos colaterais ou afetar sua ação. Não inicie ou interrompa outros medicamentos sem conversar com o seu médico ou farmacêutico.

- Outros medicamentos antiepiléticos, tais como carbamazepina, oxcarbazepina e fenitoína, utilizados para tratar convulsões, podem afetar Fycompa®. Informe o seu médico se estiver tomando ou tomou recentemente esses medicamentos, pois a sua dose pode necessitar ser ajustada.
- O felbamato (um medicamento usado para tratar epilepsia) também pode afetar Fycompa®. Informe o seu médico se você estiver tomando ou tomou recentemente esse medicamento, pois a sua dose pode precisar ser ajustada.
- Alguns medicamentos, tais como rifampicina (medicamento usado para tratar infecções bacterianas), hipérico (erva de São-João: medicamento usado para tratar ansiedade leve) e cetoconazol (medicamento usado para tratar infecções por fungos), podem afetar Fycompa®. Informe o seu médico se estiver tomando ou tomou recentemente esses medicamentos, pois a sua dose pode necessitar ser ajustada.
- Contraceptivos orais (também conhecidos como “contraceptivos hormonais”). Informe o seu médico se estiver tomando contraceptivos hormonais. Fycompa® pode tornar certos contraceptivos hormonais, como levonorgestrel, menos eficazes. Você deve usar outras formas de contracepção seguras e efetivas (preservativos ou diafragma) enquanto estiver tomando Fycompa®. Continue utilizando métodos contraceptivos por um mês após interromper o tratamento.

Converse com o seu médico sobre o método contraceptivo mais apropriado para você.

### Fycompa® com álcool

Converse com o seu médico antes de consumir álcool. Seja cuidadoso ao consumir álcool com medicamentos antiepiléticos, incluindo Fycompa®.

- Consumir álcool durante o tratamento com Fycompa® pode tornar você menos alerta e afetar a sua habilidade de dirigir e usar ferramentas ou máquinas.
- Consumir álcool durante o tratamento com Fycompa® também pode provocar sentimentos de raiva, confusão ou tristeza mais acentuados.

## **Gravidez e lactação**

Se você estiver grávida ou amamentando, suspeitar de gravidez, ou se estiver planejando engravidar, converse com o seu médico antes de tomar esse medicamento. Não interrompa o tratamento sem o consentimento do seu médico.

- Fycompa® não é recomendado na gravidez.
- Você deve usar um método confiável de contracepção para evitar ficar grávida enquanto estiver sendo tratada com Fycompa®. Continue utilizando métodos contraceptivos por um mês após interromper o tratamento. Informe o seu médico se estiver tomando contraceptivos hormonais.
- Fycompa® pode tornar certos contraceptivos hormonais, como levonorgestrel, menos eficazes. Você deve usar outras formas de contracepção seguras e eficazes (preservativos ou diafragma) enquanto estiver tomando Fycompa®. Continue utilizando métodos contraceptivos por um mês após interromper o tratamento. Converse com o seu médico sobre o método contraceptivo mais apropriado para você.

Não se sabe se os ingredientes de Fycompa® são encontrados no leite materno.

O seu médico irá ponderar os benefícios e os riscos para o bebê do tratamento com Fycompa® enquanto você estiver amamentando.

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

## **Dirigir e operar máquinas**

Não dirija ou opere máquinas até que você saiba como Fycompa® afeta você.

Converse com o seu médico sobre o efeito da sua epilepsia na capacidade de dirigir e operar máquinas.

- Fycompa® pode fazer você se sentir tonto ou sonolento, particularmente no início do tratamento. Se isso ocorrer com você, não dirija ou use ferramentas e máquinas.
- Consumir álcool durante o tratamento com Fycompa® pode tornar esses efeitos mais acentuados.

**Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas, particularmente no início do tratamento, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.**

**O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.**

## **Atenção: Contém lactose:**

**Comprimido revestido de 2 mg contém 78,5 mg de lactose.**

**Comprimido revestido de 4 mg contém 157,0 mg de lactose.**

**Comprimido revestido de 6 mg contém 151,0 mg de lactose.**

**Comprimido revestido de 8 mg contém 149,0 mg de lactose**

**Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.**

Fycompa® contém lactose (um tipo de açúcar). Se o seu médico disse que você tem intolerância a alguns açúcares, converse com ele antes de tomar esse medicamento.

**Atenção: Contém o(s) corante(s):**

**Comprimido revestido de 2 mg: óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho.**

**Comprimido revestido de 4 mg e 6 mg: óxido de ferro vermelho.**

**Comprimido revestido de 8 mg: óxido de ferro vermelho, óxido de ferro preto.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Armazene Fycompa® em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).

O prazo de validade do produto é de 36 meses a partir da data de fabricação.

A data de validade refere-se ao último dia do mês.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Fycompa® é apresentado na forma de comprimidos revestidos redondos, biconvexos, em diferentes cores e com gravações, conforme a tabela abaixo:

<b>Concentração</b>	<b>Cor</b>	<b>Gravação</b>
2 mg	laranja	E275 de um lado e 2 do outro lado
4 mg	vermelho	E277 de um lado e 4 do outro lado
6 mg	rosa	E294 de um lado e 6 do outro lado
8 mg	roxo	E295 de um lado e 8 do outro lado

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Tome Fycompa® exatamente como seu o médico lhe orientou.

### **Dose recomendada**

#### **Adultos e adolescentes**

O tratamento com Fycompa® deve ser iniciado a uma dose de 2 mg/dia.

- A dose inicial usual é de 2 mg uma vez ao dia antes de dormir.

- Seu médico pode aumentar a dose em etapas de 2 mg até uma dose de manutenção entre 4 e 8 mg – dependendo da sua resposta ao tratamento. Deve haver pelo menos um intervalo de uma semana entre os aumentos de dose.
- Dependendo da sua resposta ao tratamento com a dose de 8 mg/dia, a dose pode ser aumentada a cada 2 mg/dia até 12 mg/dia.
- Não tome Fycompa® mais do que o recomendado pelo seu médico. Pode levar algumas semanas até que o seu médico encontre a dose certa de Fycompa® para você.

A dose máxima recomendada diária é de 12 mg.

As doses de Fycompa® de 4 a 12 mg/dia demonstraram ser efetivas em convulsões de início parcial.

### **Convulsão tônico-clônica generalizada primária**

O tratamento com Fycompa® deve ser iniciado com uma dose de 2 mg/dia.

Seu médico pode aumentar a dose em etapas de 2 mg até uma dose de manutenção entre 4 e 12 mg/dia – dependendo da sua resposta ao tratamento. Deve haver pelo menos um intervalo de no mínimo uma semana entre os aumentos de dose.

A dose de Fycompa® deve ser gradualmente reduzida para interrupção do tratamento.

### **Método de administração**

- Fycompa® deve ser administrado, por via oral, uma vez ao dia antes de dormir. Os comprimidos podem ser ingeridos com ou sem alimento.
- Fycompa® pode ser tomado com ou sem alimento.
- O comprimido deve ser engolido inteiro com um copo d'água. Não mastigue, triture ou divida o comprimido.

### **Este medicamento não deve ser mastigado, triturado ou dividido.**

Se você tem problemas leves ou moderados no fígado, sua dose não deve ser maior do que 8 mg por dia e o aumento da dose deve acontecer pelo menos a cada 2 semanas.

Seu médico pode reduzir a sua dose lentamente para evitar que seus ataques (convulsões) voltem ou piorem.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você esquecer de tomar um comprimido, espere até a sua próxima dose e então tome como de costume. Não tome duas doses para compensar a dose esquecida.

- Se você tiver esquecido menos de 7 dias de tratamento com Fycompa®, continue tomando seu comprimido diariamente, como originalmente instruído pelo seu médico.
- Se você tiver esquecido mais de 7 dias de tratamento com Fycompa®, converse com seu médico imediatamente.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

### Veja o item 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Fycompa<sup>®</sup> pode causar outros eventos adversos graves, incluindo:

- Tontura, vertigem (sensação de girar) e problemas para andar normalmente. Você pode ter problemas para andar normalmente se estiver instável porque se sente tonto. Estes sintomas podem aumentar quando a sua dose de Fycompa<sup>®</sup> é aumentada. Seu risco de se sentir tonto e ter problemas para andar normalmente pode ser maior se você for idoso;
- Sonolência e cansaço;
- Maior risco de quedas. Tomar Fycompa<sup>®</sup> pode aumentar sua chance de cair. Essas quedas podem causar ferimentos graves. Seu risco de cair pode ser maior se você for idoso;
- Reação alérgica grave que pode afetar a pele ou outras partes do corpo, como fígado, rins, coração ou células sanguíneas. Esta reação alérgica pode ser fatal e pode causar a morte. Ligue para o seu médico imediatamente se você tiver:
  - uma erupção cutânea, urticária;
  - febre ou glândulas inchadas que não desaparecem;
  - inchaço do seu rosto;
  - falta de ar, inchaço das pernas, amarelecimento da pele ou do branco dos olhos, ou urina escura.

Os efeitos colaterais mais comuns do Fycompa<sup>®</sup> incluem:

- tontura;
- sonolência;
- cansaço;
- irritabilidade;
- quedas;
- náuseas e vômitos;
- ganho de peso;
- problemas para andar normalmente;
- vertigem, problemas de coordenação muscular;
- dor de cabeça;
- contusões;
- dor abdominal;
- ansiedade.

Algumas pessoas tratadas com antiepiléticos apresentaram pensamentos de se machucar ou de cometer suicídio. Se a qualquer momento você tiver esses pensamentos, contate o seu médico imediatamente.

Efeitos muito frequentes (que ocorrem em 10% dos pacientes que estão usando o medicamento):

- sentir-se tonto;
- sentir-se sonolento (torpor ou sonolência).

Efeitos frequentes (que ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que estão usando o medicamento):

- apetite aumentado ou diminuído;
- ganho de peso;
- sentir-se agressivo;

- com raiva, irritável;
- ansioso ou confuso;
- dificuldade para caminhar ou outros problemas de equilíbrio (ataxia, distúrbio da marcha, transtorno de equilíbrio);
- fala arrastada (disartria);
- visão borrada ou visão dupla (diplopia);
- sensação de rodopio (vertigem);
- sentir-se mal (náusea);
- dor nas costas;
- sentir-se muito cansado (fadiga);
- queda.

Efeitos pouco frequentes (que ocorrem em 0,1% dos pacientes que estão usando o medicamento):

- pensamentos sobre magoar-se a si próprio ou pôr fim à sua vida (pensamentos suicidas), tentar pôr fim à sua própria vida (tentativa de suicídio)
- alucinações (ver, ouvir ou sentir coisas que não existem)
- pensamentos estranhos e/ou perda da noção da realidade (perturbação psicótica)

Efeitos desconhecidos (não é possível calcular a frequência deste efeito indesejável a partir dos dados disponíveis):

- Reação a fármaco com eosinofilia e sintomas sistêmicos, também conhecida por DRESS ou síndrome de hipersensibilidade induzida por fármaco: erupção generalizada na pele, temperatura corporal elevada, elevação de enzimas do fígado, anomalias do sangue (eosinofilia), gânglios linfáticos aumentados e envolvimento de outros órgãos.
- Síndrome de Stevens-Johnson, SSJ. Esta erupção cutânea grave pode surgir sob a forma de máculas em alvo avermelhadas ou exantemas circulares, frequentemente com bolhas centrais no tronco, descamação cutânea, úlceras na boca, garganta, nariz, genitais e olhos, e pode ser precedida por febre e sintomas gripais.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Se tiver tomado uma dose mais alta de Fycompa® do que deveria, contate o seu médico imediatamente. Você pode apresentar confusão, agitação e comportamento agressivo e um estado de consciência diminuída.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS****Registro: 1.2576.0029****Importado e Registrado por:**

United Medical Ltda.

São Paulo - SP

CNPJ: 68.949.239/0001-46

**Produzido por:**

Eisai Manufacturing Limited.

Hatfield - Reino Unido

**SAC 0800 770 5180**[sac.brasil@knighttx.com](mailto:sac.brasil@knighttx.com)

® Marca registrada

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO COM RETENÇÃO DE RECEITA****Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 17/12/2025.**

Knight® e uma marca registrada de Knight Therapeutics Inc.

### Histórico de alteração da bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula			Dados das alterações de bulas			
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
11/07/2019	0606316/19-1	10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	29/03/2018	0246406/18 -3	10458 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	25/06/2018	VP/VPS Versão inicial	VP VPS	Comprimido revestido 2mg, 4mg, 6mg e 8mg
11/07/2019	0627472//19-2	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	14/09/18	1134006/18 -1	11121- Novo- Inclusão de Indicação Terapêutica Nova no País	01/06/19	VP 1. Para que este medicamento é indicado? 6. Como devo usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?  VPS 1. Indicações 2. Resultados de Eficácia; 3. Características Farmacológicas 4. Reações Adversas	VP VPS	Comprimido revestido 2mg, 4mg, 6mg e 8mg
05/09/2019	2115923/19-8	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de	-	-	-	05/09/2019	VP/VPS III - Dizeres legais:	VP VPS	Comprimido revestido 2mg, 4mg, 6mg e 8mg

		Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12					Embalagem secundária		
04/03/2021	0856794/21-8	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	02/09/2020	2982303/20-0	11121-Novo- Inclusão de Indicação Terapêutica Nova no País	08/02/2021	<p>VP</p> <p>1. Para que este medicamento é indicado?</p> <p>4. O que devo saber antes de usar este medicamento?</p> <p>8. Quais os males que este medicamento pode me causar?</p> <p>VPS</p> <p>1. Indicações</p> <p>2. Resultados de Eficácia</p> <p>5. Advertências e Precauções</p> <p>6. Interações Medicamentosas</p> <p>8. Posologia e Modo de usar</p> <p>9. Reações Adversas</p>	VP VPS	Comprimido revestido 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg
27/09/2022	4750055/22-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de	-	-	-	-	VP/VPS III - Dizeres legais	VP/VPS	Comprimido revestido 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg

		Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12							
30/11/2023	1350678/23-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	-	-	-	-	III - Dizeres legais	VP/VPS	Comprimido revestido 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg
27/06/2024	0878930248	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	-	-	-	-	VP 3. Quando não devo usar este medicamento ? 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? Dizeres legais  VPS 5. Advertências e Precauções 9. Reações Adversas III - Dizeres legais	VP/VPS	Comprimido revestido 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg

19/09/2024	1292123249	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	VP 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? VPS 10. Superdose	VP/VPS	Comprimido revestido 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg
01/04/2025	0445004258	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	-	-	-	-	VP Composição 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? Dizeres legais VPS 5. Advertências e Precauções 9. Reações Adversas III - Dizeres legais  VPS I - Identificação do medicamento 5. Advertências e Precauções III - Dizeres legais	VP/VPS	Comprimido revestido 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg
17/12/2025	Não disponível	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de	-	-	-	-	VP 4. O que devo saber antes de	VP/VPS	Comprimido revestido 2 mg, 4 mg, 6 mg e 8 mg

---

		Alteração de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12					usar este medicamento? Dizeres legais VPS 5. Advertências e Precauções Dizeres legais		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--