

## Texto de Bula para o Paciente - Lymphomyosot® Solução Gotas

Lymphomyosot®  
Myosotis arvensis D3 + ASSOCIAÇÃO

MEDICAMENTO ANTI-HOMOTÓXICO

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução Gotas – Frasco com 30 ml – 18 gotas/ml.

### USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada 30 ml contém: 1,433 g de Myosotis arvensis D3; 1,433 g de Veronica officinalis D3; 1,433 g de Teucrium scorodonia D3; 1,433 g de Pinus sylvestris D4; 1,433 g de Gentiana lutea D5; 1,433 g de Equisetum hyemale D4; 1,433 g de Sarsaparilla D6; 1,433 g de Scrophularia nodosa D3; 1,433 g de Calcarea phosphorica D12; 1,433 g de Natrium sulfuricum D4; 1,433 g de Fumaria officinalis D4; 1,433g de Levothyroxinum D12; 1,433 g de Aranea diadema D6; 2,866 g de Geranium robertianum D4; 2,866 g de Nasturtium aquaticum D4 e 2,866 g de Ferrum iodatum D12. Excipiente: Água purificada. Conteúdo em etanol: 35% (vol.).

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Lymphomyosot® é indicado como auxiliar no tratamento dos edemas de origem linfática (acúmulo de líquidos nos tecidos) e infecção, no intumescimento glandular e aumento do tamanho das amídalas.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

A aplicação do medicamento anti-homotóxico atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as toxinas produzidas pelo organismo, ou ingeridas, ou inaladas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível o equilíbrio biológico. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos da imunologia.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado sem acompanhamento médico, nos casos de distúrbios da tireóide.

Este medicamento é contraindicado às pessoas com alergia (hipersensibilidade) aos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Durante a lactação não use este medicamento sem orientação do seu médico.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento contém 35 vol.-% de álcool (etanol) e pode causar intoxicação, especialmente em crianças. Em virtude do teor alcoólico, Lymphomyosot® deve ser administrado nos casos de doenças hepáticas e alcoolismo, somente com acompanhamento médico.**

**Atenção: Contém lactose abaixo de 0,25 g/ml.**

## Texto de Bula para o Paciente - Lymphomyosot® Solução Gotas

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.  
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve guardar este medicamento, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Após aberto, válido por 6 meses.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

**Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

A solução de Lymphomyosot® é levemente amarelada, com sabor e odor levemente alcoólico.

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se você poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Este medicamento é de uso oral. Você deve tomar as gotas prescritas com um pouco de água.

**Dose recomendada para adultos e crianças: 15 a 20 gotas 3 vezes ao dia.**

Mantenha o frasco sempre fechado após o uso.

**Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.  
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Caso os sintomas persistam por mais de 2 dias ou se agravem, suspenda o uso do medicamento e entre em contato com o seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação do prescritor.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 2 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você esqueça-se de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico, ou farmacêutico.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjoo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico, ou o farmacêutico.

## Texto de Bula para o Paciente - Lymphomyosot® Solução Gotas

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Venda sob prescrição médica.**

Registro: 1.6198.0012

Produzido por:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 – Baden-Baden, Alemanha

Importado por:

Herbarium Laboratório Botânico Ltda.

Av. Santos Dumont, 1100

83403-500 – Colombo - PR

Registrado por:

Heel do Brasil Biomédica Ltda.

Avenida Santos Dumont, 1100 3º andar

83403-500 – Colombo – PR

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

www.heel.com.br

**- Heel**

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 04/12/2025.

